НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ***ИНВИТРО***, тел.: *(095) 363-0-363*

НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО, Тел./факс.: 363-0-363 (многоканальный), www.invitro.ru

заполнять ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ буквами

Заказчик: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Пациент: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Дата рождения: ☐☐/☐☐/☐☐ (число / месяц / год) Пол: ☐ муж ☐ жен Дата взятия образца: ☐☐/☐☐/0☐ (число / месяц / год) Время взятия образца: ☐☐:☐☐ (час / мин.)

Диагноз: _____ Номер страхового полиса: ☐☐☐☐☐☐

Результат исследования уровня глюкозы в капиллярной крови:

Полученное значение	**ФИО сотрудника, проводившего исследование**	**Подпись сотрудника**

С полученным результатом исследования уровня глюкозы в капиллярной крови и характером предстоящего исследования (причинами отказа в проведении исследования) ознакомлен.

_____ /_____/ «____»_____200___г.

Подпись пациента ФИО пациента

Глюкозо-толерантный тест. Исследование до нагрузки.

- пробирка с красной крышкой, подписать **«ДО НАГРУЗКИ»**

ГТГ1	Определение глюкозы

- пробирка с красной крышкой, сыворотку после центрифугирования отделить, заморозить, подписать **«ДО НАГРУЗКИ»,** хранить и транспортировать при -20С

ГТГС1	Определение глюкозы и С-пептида

Глюкозо-толерантный тест. Исследование через 2 часа после нагрузки.

- пробирка с красной крышкой, подписать **« ПОСЛЕ НАГРУЗКИ»**

ГТГ2	Определение глюкозы

- пробирка с красной крышкой, сыворотку после центрифугирования отделить, заморозить, подписать **«ПОСЛЕ НАГРУЗКИ»,** хранить и транспортировать при -20С.

ГТГС2	Определение глюкозы и С-пептида