

Жеке өтініш нөмірі (Индивидуальный номер заявки):	999999999
Науқас, жынысы (Пациент, пол):	(Ж)
Туылған күні, жас (Дата рождения, возраст):	26.06.1980 (46 лет)
Науқастың ЖСН/шетелдіктер үшін паспорт нөмірі (ИИН пациента/№ паспорта, для иностранцев):	-
Тұрғылықты мекенжайы, азаматтық (Адрес проживания, гражданство):	-
Дәрігер, ID (Врач, ID):	
Медициналық ұйым (Медицинская организация):	
Үлгі алынған күні және уақыты (Проба взята):	21.08.2026 09:00
Үлгі түскен күні және уақыты (Проба поступила):	21.08.2026 13:52
Дәрігердің растау күні (Подтверждено врачом):	21.08.2026 13:52
Нәтиже шығарылған күні (Дата печати результата):	21.08.2026

Зерттеу (Исследование)	Нәтиже (Результат)	Өлшем бірліктері (Единицы)	Референс мағыналары (Референсные значения)	Түсіндірме (Комментарий)
АТ к тканевой транслугтаминазе, IgA	25.00*	Ед/мл	<20	Отрицательные < 20 Ед/мл Положительные >= 20 Ед/мл Тест-система: Anti-Transglutaminase ELISA (IgA), EUROIMMUN

Исполнитель Аксенова А.В., Врач клинической лабораторной диагностики

* – Нормадан шыққан нәтиже (Результат, выходящий за пределы референсных значений)

Түсіндірме (Комментарий):

Антитела к рекомбинантной тканевой транслугтаминазе 2 человека (ТТГ/ТГ2) класса IgA являются основным методом диагностики целиакии и рекомендованы для серологического скрининга (см. международные рекомендации ESPAGHN 2012). Чувствительность выявления антител к эндомизину (АЭА) при целиакии составляет 98% (у детей 96%) при специфичности 99-100%, частота в европейской популяции варьирует 0,3-1% среди здоровых, 10-15% в группах риска и 2-4% среди родственников больных. Выявление антител к ТТГ IgA более 200 U/ml (в 10 раз больше границы нормы) и обнаружение АЭА IgA позволяет поставить диагноз целиакии и назначить безглютеновую диету. При умеренно повышенных значениях антител к ТТГ IgA рекомендуется проведение эндоскопии и морфологического исследования стенки кишки. Назначение диеты до постановки диагноза не рекомендуется. После назначения безглютеновой диеты титры антител к ТТГ IgA снижаются ниже детектируемых к 9-12 месяцам, и сохранение высоких титров/повторное повышение свидетельствует о несоблюдении диеты и прогрессировании аутоиммунного заболевания. Антитела к ТТГ IgA могут быть обнаружены при латентной (скрытой) целиакии и потребовать углубленного обследования для выявления заболевания.

Подпись заведующего лабораторией ТОО «ИНВИТРО-Казахстан» Поповой М.А. в настоящем бланке не является подписью лица, выполняющего лабораторные исследования; указанная подпись подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации, подготовленной на основании результатов лабораторных исследований, выполненных ООО «ИНВИТРО».

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. INVITRO.KZ

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача